

PIA- (ähnliche) Durchfälle in der Schweinemast

Immer wieder treten in der Schweinemast Durchfälle auf. Nicht selten kann der PIA-Erreger festgestellt werden und eine orale Impfung schafft Abhilfe. Allerdings ist dies nicht immer der Fall. Die Symptome sind dieselben, aber der Nachweis des PIA-Erregers gelingt nicht, auch die Impfung schlägt nicht an. Unsere Empfehlung lautet dann, auf eines unserer „Humin-Futter“ zu wechseln. Dies enthält gegenüber dem vergleichbaren Standardfutter mehr Rohfaser und Huminsäuren, die den Darm beruhigen. Besonders gern treten die Durchfälle bei einem Lebendgewicht von ca. 70 kg auf. Die Tiere sind in dieser Phase schon sehr nah an der maximalen Futteraufnahme und die Darmflora scheint dem nicht mehr Stand zu halten. Es setzen sich die falschen Keime im Darm durch mit Durchfall als Folge. In der Praxis sehen wir, dass es erfolgreicher und kostengünstiger ist, vorsorglich auf dieses Problem zu reagieren. Die Darmflora der Tiere ist deutlich stabiler, wenn im Vorfeld eines unserer Humin-Futter gefüttert wurde. Sie hält dann in der kritischen Phase eher Stand. Unsere Empfehlung für Betriebe, die Probleme mit Durchfällen in der Mittelmast haben, ist daher nach dem Begrüßungsfutter 10 bis 20 kg **HANSA ASS 13.2 Humin** je Tier zu füttern.

Stress in der Aufzucht und Mast ...

Anfängliches Überbelegen und nachträgliches auseinander Treiben der Tiere mag die Durchgänge pro Jahr erhöhen, sind aber Gift für Leistung, Gesundheit und Futterverwertung. Ein weiterer wichtiger Stressor ist der Zugang zum Futter. Alle Tiere sollten einen möglichst freien Zugang zum Futter haben. Je weiter das Verhältnis Tiere je Fressplatz, desto mehr Stress haben die Tiere. Eine Ursache für erhöhtes Auftreten von Salmonellen in den Beständen ist übrigens Stress und ruhende Salmonellen setzen sich bei gestressten Tieren eher durch.

Wenig Stress und bedarfsgerechte Fütterung fördern ein gutes Immunsystem. Muss dieses dennoch reagieren aufgrund von z.B. Atemwegsinfekten, dann sinkt schnell die Futteraufnahme. Weiter kosten Immunreaktionen Energie und vor allem Aminosäuren. Beides fehlt dann für den Fleischansatz.

Futtertischbeschichtung - fertige Arbeit aus einer Hand

Der Maschinenring Zeven und HANSA Landhandel bieten Ihnen eine Futtertischbeschichtung mit Desical Agro Coating als fertige Arbeit an. Der MR Zeven übernimmt die Arbeiten bis zur Fertigstellung, wir liefern die Produkte für die neue Beschichtung. Ein „sauberer Teller“ kann die Futteraufnahme erhöhen. Der MR koordiniert die Aufträge und Termine, rufen Sie bitte direkt an 04281/93930.



(vorher) / (nachher)

Grundfutterknappheit

Die knappe Grundfuttersituation bereitet vielen Milchviehhaltern weiterhin Kopfzerbrechen. Wir bieten Ihnen für diesen Fall HANSA PROLAC FASER an, es setzt sich zum großen Teil aus pansenchonenden Faserfuttermitteln und Mais zusammen. PROLAC FASER kann zum Beispiel in einer Stroh-Trocken-TMR für Rinder eingesetzt werden oder in anderen Rationen den Grundfuttereinsatz reduzieren. Sprechen Sie uns bitte an.

Ackergras – frühe Ernte durch NTS-Flüssigdüngung

Die Bestände beim Ackergras und Grünschnittroggen zeigen sich gut entwickelt. Eine frühe Futterbergung mit gutem Ertrag ist das Ziel. Nutzen Sie die Vorteile einer NTS-Düngung gegenüber der Gülle. Sobald es die Befahrbarkeit ab Mitte Februar zulässt, bietet die Ausbringung mit speziellen Düsen eine sehr schnelle Stickstoffwirkung. Ein paar Tage Frostfreiheit sind ausreichend und die positiven Erfahrungen mit dem sehr frühen Einsatz im Grünland haben sich bestätigt. Ob Getreide, Raps oder Grünland - die Spezialisten Martin Lingner (04767-939313) und Björn Hausmann (04281-710184) beantworten Ihre Fragen.


Werden Sie Saatgut-Vermehrter

Um den steigenden Bedarf an Mischungskomponenten zu decken, suchen wir Landwirte, die für uns im Vertragsanbau Gräser anbauen. Die Vermehrung von Gräsern und vor allem Welsches Weidelgras ist interessant, da hier neben der eigentlichen Samenproduktion, auch die Folgeaufwüchse zur Futterproduktion genutzt werden können. Bei frühzeitiger Aussaat von Welschem Weidelgras in diesem Jahr wäre auch noch ein Schnitt vorm Winter möglich. In Ihrem Anbau ist die Vermehrung von Gräsern ein zusätzliches Fruchtfolgeglied. Neben Gräsern vermehren wir auch Zwischenfrüchte und Hybrid-Raps verschiedener Züchtungshäuser. Als unsere Vermehrungspartner beraten wir Sie zu Anbau, Düngung, Pflanzenschutz und betreuen mit Ihnen die Flächen. Werden Sie Saatgut - Vermehrter und profitieren Sie von der Zusammenarbeit mit Meiners-Saaten.



YaraMila Mais – der Unterfußdünger der „MEHR“ kann

Pflanzenanalysen zeigen häufig Magnesium-, Zink- und Bormangel. Dies tritt besonders auf den leichten Mais-Standorten auf, die schnell zu Trockenheit neigen. **YaraMila Mais** verfügt neben einem ausgewogenen Anteil von Stickstoff und Phosphat auch über einen hohen Gehalt an Magnesium, Schwefel, Bor und Zink. Als Unterfußdünger stehen diese wichtigen Nährstoffe der jungen Maispflanze von Beginn an zur Verfügung und ermöglichen eine zügige Jugendentwicklung.



Aus unserem Kundenkreis verkauft ...

H.-J. Osmers aus 28832 Embsen, ca. 700 m³ Grassilage aus 2019 (2.Schnitt) 0173/9929612