

Komponenten (Samenanteile %)	Besonderheiten: organische Düngung möglich >Auflagen beachten	Aussaatstärke (kg/ha)	Getreide	Mais	Kartoffel	Zuckerrübe	Raps	
---------------------------------	---	--------------------------	----------	------	-----------	------------	------	--

HANSA Boden Profi Aktiv


 57 % Ölrettich (*Siletta Nova*)
 17 % Öllein
 15 % Perserklee
 11 % Sommerwicke

* schnellwüchsig
 rasche Unkrautunterdrückung
 *aktive Durchwurzelung;
 ***SILETTA NOVA** mindert *aktiv* die
 bei Kartoffeln virusbedingte
 Eisenfleckigkeit


28 - 35 kg
 Anfang - Ende August

						
---	---	---	---	--	--	--



HANSA Boden Profi Neutral

35 % Öllein
 44 % Phacelia
 13,5 % Perserklee
 7,5 % Sommerwicke
 (Bindung von Stickstoff)


 *kohlenstoffneutral!
 *Klee sorgt für Stickstoffbildung;
 *gute Durchwurzelung;
 *schnelle Beschattung erhält
 Bodengare

25 - 32,5 kg
 Mitte Juli - Mitte
 August

						
---	---	--	--	---	--	--



HANSA Boden Profi Senf / Ölrettich

60 % Gelbsenf Semper/Seco "spät"
 40 % Ölrettich EU Sorte "früh"

*schnelle Jugendentwicklung >
 gute Unkrautunterdrückung
 -> friert anschließend ab

15 - 19 kg
 Ende August - Anfang
 Oktober

						
---	---	--	--	--	--	--



HANSA Boden Profi Winterfest

36,4 % Winterrüben
 25,5 % weißer Senf
 38,2 % Winterfuterraps

*gräserfrei!
 *schnelle Jugendentwicklung;
 *gute Unkrautunterdrückung
 (Weißsenf)
 *Verringerung von
 Nährstoffauswaschungen im
 Winter bei durchgängiger
 Begrünung

12 - 15 kg
 Ende August - Anfang
 Oktober

						
---	---	--	--	--	--	--



HANSA Boden Profi Green Plus

61 % Welsches Weidelgras
 36 % Inkarnatklee
 1 % Winterwicken
 2 % Pannonische Wicke


 *gute Winterhärte
 *für alle Böden, hoher TM-Ertrag
 und TOP Futterwert
 *hohe Wurzelmasse, Ernte ab:
 15.02. im Folgejahr

30 - 35 kg
Futternutzung: 40 kg/ha
 Ende August - Mitte
 September

						
---	---	--	--	--	--	--



HANSA Boden Profi Wasserschutz

52 % Rauhafer
 15 % Öllein
 23 % Phacelia
 10 % Sonnenblumen

*Verringerung der
 Nährstoffauswaschungen
 *gute Durchwurzelung mit flach- u.
 tiefwirkenden Pflanzen
 *Öllein bildet Korkenzieherwurzel
 *kohlenstoffneutral > wichtig bei
 Rapsfruchtfolgen

20 - 25 kg
 Anfang August - Mitte
 September

						
---	---	--	--	---	--	--

